

令和元年度ウミガラス保護増殖事業の実施状況

1. 業務内容および実施報告

1-1. ウミガラスの繁殖個体誘引と繁殖状況のモニタリング

(1) 目的

ウミガラスは、北太平洋や北大西洋の亜寒帯の離島や海岸の断崖で集団営巣し、潜水して魚を捕えるウミスズメ科の大型種である (del Hoyo et al. 1996). 亜種 *inornata* はオホーツク海沿岸、カムチャツカ半島、千島列島、コマンドル諸島、ベーリング海沿岸、サハリンのチュレニー島、朝鮮半島北部の小島で繁殖し、北海道の天売島は繁殖分布の南限付近に位置している (日本鳥学会 2012). 日本国内の繁殖地は、現在、天売島に限られるが、かつては松前小島、ユルリ島、モユルリ島、根室市落石岬にも繁殖コロニーがあった (環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室 2014). 天売島での生息数は、1963 年に 8000 羽と推定されたが、1960 年代後半から急減し、1970 年代には 500–1000 羽、2000 年以降は 20–30 羽前後 (最大 60 羽) である (付表 3). 生息数が減少した理由は明確にはわかっていないが、ウミガラスの雛の餌資源となっているイカナゴの減少、1981 年まで行われていたウミガラスを攪乱するような観光事業、1960–1970 年代に盛んだったサケ・マス流網あるいは底刺網による混獲などが影響した可能性がある (環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室 2014; Hasebe et al. 2015). ウミガラスの集団繁殖地を回復させるための取り組みとして、1989 年には擬岩の設置や人工的な営巣場所の造成の試み (北海道保健環境部自然保護課 1990)、1990 年からはデコイの設置が地元自治体や住民らが中心となってはじまり (北海道保健環境部自然保護課 1991)、2003 年からは環境省が主体となるウミガラス保護増殖事業計画としてデコイと音声による繁殖個体の誘引が継続的に実施されている。

かつての天売島ではウミガラスの繁殖コロニーが複数の岩場に分布していた。赤岩では 1970 年代まで、古灯台 A では 1990 年まで、屏風岩、カブト岩では 1993 年まで、古灯台 B-1 では 1997 年まで、古灯台 B-2 では 2004 年まで繁殖していた。また、2006–08 年に実施した音声による誘因によって、屏風岩の開けた岩場に複数の個体が飛来して繁殖も確認されたが、ハシブトガラス *Corvus macrorhynchos* やオオセグロカモメ *Larus schistisagus* の捕食ですべて繁殖に失敗した。そして 2009 年以降は現在に至るまで、赤岩対岸の崖にある閉鎖的な窪み (便宜的に、赤岩対崖とよばれている) のみで繁殖している。繁殖つがい数が極めて少なくなった近年では、オオセグロカモメやハシブトガラスによる卵や雛の捕食が繁殖失敗の主要因となっていた (Hasebe et al. 2012). このため 2011 年からは唯一残された赤岩対岸の崖にある繁殖コロニー周辺での捕食者対策を強化し、コロニー周辺に定住しているオオセグロカモメやハシブトガラスの捕獲をはじめた。その捕食者対策の後、2011–2019 年にかけて 7–23 羽の雛が 9 年連続で巣立ちに成功している。

本報告では、2019 年の赤岩対岸の崖で繁殖するウミガラスの繁殖状況を報告する。

(2) 調査方法

デコイと音声を用いた誘引

赤岩対岸にある崖の窪みは、海面から高さ 25m 程度の高さにあり、非常に崩れやすい切り立った崖の中ほどに位置する (図 1)。そしてその中には、登攀専門家によって 2009 年より前に設置された直立姿勢の立ちデコイ 7 体、2009 年に設置された立ちデコイ 29 体と抱卵姿勢の座りデコイ 7 体、2012 年に設置した立ちデコイ 3 体を含む合計 46 体のデコイ (立ちデコイ 39 体、座りデコイ 7 体) が設置されている (図 4)。

近年は、ウミガラスの飛来数増加に伴い営巣範囲が拡大している一方で、繁殖の失敗やハシブトガラスの侵入なども確認されている。そのため 2018 年度は、関係者にヒアリングを行った結果と 2017 年度ウミガラス保護増殖事業検討会での意見を基に、誘引やカラス等の捕食者の障壁となるデコイ再設置計画を策定し、2018 年 8 月 21 日に 27 体のデコイの再設置を実施し、2019 年 4 月 24 日に 6 体のデコイを設置した (図 4)。なお、デコイの再設置は、(公財) 東京動物園協会葛西臨海水族園による野生動物保護基金助成事業 (事業主体: (公財) 日本動物園水族館協会) により実施した。

また繁殖地の直下から 20m ほど北東方向に離れた位置に、2019 年 3 月 21 日に音声装置を設置し、音声誘引を開始した。この音声装置は、充電制御装置、音響機器、拡声機 (4 個)、蓄電池、太陽電池パネル (2 個) から構成されており、天売島で録音したウミガラスの音声を自動的に日中のみ再生した。8 月 18 日に機器を固定している単管パイプを残して、全ての音声機器を撤去した。また、音声装置の単管パイプは老朽化していたため 2017 年 9 月 8 日に撤去し新設した。音声誘引は 2009~2013 年までの 5 年間は 4 月から開始していたが、天売島近海を通過して北方の繁殖地に移動するウミガラスの個体が 3 月に増加すると考えられることから、2014 年以降は 3 月から音声誘引を開始している (各年の音声誘引開始日は 2015 年 3 月 20 日、2016 年 3 月 26 日、2017 年 3 月 18 日、2018 年 3 月 24 日)。




図 1. (a) 赤岩の対岸に位置するウミガラスの繁殖巣棚 (赤岩対崖) と全体の概要. (b) 音声装置の概要. 音声装置は、2 枚の太陽電池パネルで 1 つのバッテリーを充電して、4 つのスピーカーからウミガラス声を日中のみ再生した. (c) 電源装置の概要. 電源装置は 4 枚の太陽電池パネルで 4 つのバッテリーを充電した. 約 60m のケーブルで繁殖地に設置した CCD カメラに電力供給し、太陽電池パネルの下に設置した録画装置に映像を記録.

CCD カメラを用いた繁殖モニタリング

ウミガラスの繁殖巣棚は、地上から 25m の断崖の窪みの中に形成されるため、海岸線や赤岩からは巣の位置・卵・巣内の雛を直接観察することができない. このため繁殖巣棚内に設置した CCD カメラを用いてウミガラスの繁殖状況をモニタリングした (図 2). 2019 年 4 月 23 日に登攀専門家によって繁殖コロニー内に CCD カメラ 4 台 (Lカメラ, Rカメラ, WLカメラ, WRカメラ), インターバルカメラ 1 台, マイク 1 台, 赤外線照明器 2 台, 繁殖コロニー内でウミガラスの声を流すための小型スピーカー 1 台を設置し、これらの装置を 4 月 25 日から稼働させた. 近年ウミガラスの飛来数が増加し巣棚内での利用範囲が広がっているため、CCD カメラ 4 台のうち 2 台については、繁殖の可能性のある範囲を広範囲に録画できるように設置した. これらの繁殖巣棚に設置された機器は、全長約 60m のケーブルを介して、海岸線の架台に設置した太陽電池パネル・バッテリー・録画装置に接続した (図 1).

CCD カメラのレンズ面に汚れが付着すると、ウミガラスの繁殖状況を映像から確認できなくなるため、

CCD カメラをフィルム巻き取り式防汚装置の中に入れた。電源を入れてから 2 時間後に 1 回だけ動作するように設定されている (図 2)。この装置の 2014 年度版はフィルムに汚れが固着して動作不良を引き起こしたが、2015 年以降は装置の外装ケースは 3D プリンタで製作して密閉性が向上し、録画した期間を通して、きれいな映像が撮影できるようになった。

CCD カメラに電力を供給するバッテリーは 4 枚の太陽電池パネルを用いて充電した (図 1)。そして、タイマーと充放電制御装置を使用し、繁殖ステージに関わらず一定の時間帯を撮影した。

映像を撮影する目的は繁殖ステージの進行と共に変わるため、2016 年までは撮影時間帯を時期に応じて変えていたが、繁殖期の進行に伴って撮影時間帯を変更すると、産卵日、孵化日、巣立ち日は繁殖ペアによってかなりバラツキがあり、個別の繁殖ステージには合わせることができないという問題も生じるため、2017 年からは繁殖期の進行に伴って撮影時間帯を変更せずに、全期間を通して同じ撮影時間帯に設定し、それぞれの個体の繁殖ステージを全て記録できるようにした。2019 年はより詳細なデータを得るために、4~20 時の連続撮影を行い合計 16 時間録画した。ただし、タイマーどおり録画されていない時間帯もあったため、録画合計時間は 1360 時間 6 分であった。(詳細は付表 1 を参照)。また、小型モニターを録画装置に接続して、巣内の映像を現場でも確認できるようにした。録画装置は 2 台用意し、1-2 週間を目安にして交互に取り換えて、持ち帰った録画装置はデータをバックアップ保存して、録画内容を確認した。そして 2019 年 4 月 25 日~8 月 17 日まで、赤岩対崖の繁殖地の映像を継続的に撮影した (付表 1)。しかし、2019 年は 6 月 25 日~7 月 7 日の期間は落石によりケーブルが断線し、CCD カメラにより録画することができなかった。その後修繕作業を行い復旧したが、7 月 30 日以降、再びケーブルが断線したため繁殖巣棚に向かって右側のカメラ WR の録画が完全にできなくなった。(図 3)。

巣棚内に設置した小型スピーカーは 1 分毎に 30 秒間音声を再生した。また、ウミガラスのヒナの巣立ち状況を把握するために電池式のインターバルカメラも 1 台設置した。インターバルカメラは、4 月 25 日~8 月 17 日の 116 日間設置し、4-19 時の時間帯で 20 秒に 1 回撮影を行った。

ウミガラスの繁殖がすべて終了した後、2019 年 8 月 18 日に音声装置の撤収と併せて、録画装置も全て撤収し、それらを固定していた単管パイプの骨組みのみ残置した。

全長約 60m のケーブル類は、録画装置の設置前に準備しておく必要があるため 2019 年 4 月 22 日に赤岩ガリー (赤岩対崖にある山腹を上下に走る広い岩溝) に沿って敷設した。ガリーに沿って敷設すると落石に当たり断線しやすいため、落石に当たらないようになるべく斜面に沿わせて敷設しようとしたが、落石により 5 か所が断線するというトラブルが発生した。

今後も落石が発生し録画できなくなるということを考慮すると、ケーブルの敷設ルートは赤岩ガリーを避けて敷設するという必要もあると思われる。



図 2. (a) 赤岩対岸のウミガラスの繁殖巣棚, (b) 繁殖巣棚内に設置したフィルム巻き取り式防汚装置付き CCD カメラ, (c) 繁殖巣棚内に設置した小型スピーカー, (d) 入口側からみて繁殖巣棚の左部分 (WL カメラは広範囲を撮影できるように設置), (e) 繁殖巣棚の中央部分 (左から L カメラ, R カメラ, マイクはデコイの嘴部分に装着, 繁殖巣棚の天井に赤外線照明を設置), (f) 繁殖巣棚の右部分 (WR カメラは広範囲を撮影できるように設置,), (g) 繁殖巣棚内に設置したインターバルカメラ.





図 3. ケーブルの損傷状況

(a)



(b)




図 4. 赤岩の対岸に位置する繁殖巣棚における (a) デコイと CCD カメラの位置および (b) 2012 年から 2019 の 8 年間に利用されたウミガラスの営巣場所.

繁殖ステージの進行とコロニー内の個体数変化

2019年4月24日から8月10日まで繁殖コロニー内のCCDカメラの映像から、撮影時間内の全ての正時（例えば17時のように、分・秒の端数のつかない時刻）にコロニー内のウミガラスの成鳥の個体数を数えた。そして、コロニー内でその日にカウントされた最も多かった個体数を最大個体数、最も少なかった個体数を最小個体数とみなし、繁殖ステージの進行にともなう最大および最小個体数の変化を調べた。

・遺伝子分析のためのサンプル回収

2019年8月18日に機材の撤去に合わせて、ウミガラスの羽や卵殻などの残渣を回収し保管した。現段階では天売で繁殖する個体がサハリンなど他地域で繁殖する個体群と同じ個体群なのか、また巣立った個体が戻っているのかということは明らかとなっていない。そのため今後、遺伝子分析を実施し、他地域との遺伝子との違いや、天売に飛来している個体の関係を明らかにしていく予定である。

(3) 結果と考察

繁殖成績の年比較

2019年の赤岩対岸の崖のコロニーに飛来した個体の最大数は57個体、海上においては62個体を確認することができた(付図1)。確実に産卵まで至った繁殖つがい数は26つがい、巣立ち成功を確認できたつがい数は23つがいであった。2019年の飛来数、繁殖つがい数、巣立ちに成功したつがい数は、過去20年間で全て最多となった(図5)。巣立ち雛数については、卵や雛の捕食者となるオオセグロカモメとハシブトガラスを捕食者対策を始めた2011~2019年は、7から23個体の雛が比較的安定して巣立っている。赤岩対岸の崖のコロニーにおける捕食者対策の前後の巣立ち成功率を比較すると、対策前の33%から、対策後の9年間は78%まで向上した(表1)。

2012年から2019年までの8年間で、赤岩対岸のコロニーにおける各営巣場所の巣立ち成功率を個別に集計した。ただし、2019年は5月4日及び9日にウミガラスがWLカメラに衝突しWLカメラ画角が変わったことにより繁殖巣棚に向かって右側の一部分が録画できなかったため、R4より右側の正確なデータは把握することができなかった。2012~2019年までの8年間に、赤岩対岸の崖の窪みに形成された繁殖コロニーでは、合計32カ所で営巣が確認された(表2)。ウミガラスは巣材を使用せず、地面に直に1卵だけ産卵するため、営巣位置はCCDカメラの映像から親の抱卵姿勢、卵もしくは雛の位置に基づいて特定した。営巣場所は、壁沿いの巣と壁沿いではない巣に区分した。壁沿いの巣は、捕食者の攻撃に対して前方だけを守ればよいから、壁沿いではない巣と比べて、捕食者から卵や雛を守りやすいと考えられる。過去5年間で、壁沿いでない巣場所(26カ所)の利用率は23.0%(=26/113*100)、壁沿いの巣場所(85カ所)の利用率で75.2%(=85/113*100)、不明1.8%(=2/113*100)であった。つまり、赤岩対岸で繁殖するウミガラスは、断崖にある窪みの中の壁沿いを巣場所にすることが多く、壁沿いでない場所が巣として利用される割合は低いことがわかった。さらに、過去5年間の壁沿いの巣と壁沿いではない巣の巣立ち成功率を比較すると、壁沿いの巣は79%が巣立ちに成功していた。一方で、壁沿いでない巣は54%が巣立ちに成功していた(表3)。2016年までは、壁沿いでない巣での巣立ち成功率は0%であったが、2017年は壁沿いでない巣の巣立ち成功率が75%(4カ所のうち3カ所の巣で巣立ちに成功)で、2018年は57%(7カ所のうち4カ所の巣で巣立ちに成功)、また2019年は78%(9カ所のうち7カ所の巣で巣立ちに成功)であった。これは、育雛経験が浅く今まで繁殖に失敗していた若い個体が今年は繁殖に成功したという可能性や2018年8月にデコイを再配置したことによりカラス等の捕食者の障壁となりウミガラスの卵やヒナが狙われにくくなったこと、またコロニーサイズが徐々に大きくなってきているため捕食者が巣棚に飛来してきたとしても防御することができるようになってきているといった可能性が考えられる。




図 5. 赤岩対岸のウミガラスの繁殖コロニーにおける 2006 年から 2019 年までの 13 年間の飛来数，つがい数，巣立ち雛数の年変化．数字はそれぞれの数を示す．

注) 2015 年は CCD カメラを 2 台しか設置することができなかったため，繁殖巣棚に飛来した個体全てを確認することはできなかった．

表 1. 赤岩対岸のウミガラスの繁殖コロニーにおける捕食者対策前後の巣立ち成功率の比較.

巣立ち成功率	
捕食者対策前 (2008~2010)	33% (12ペア中4ペア)
捕食者対策後 (2011~2019)	78% (150ペア中118ペア)

表 3. 赤岩対岸のウミガラスの繁殖コロニーの壁沿いの巣と壁沿いでない巣における巣立ち成功したペアと失敗したペアの 2015 年から 2019 年までの 5 年間の合計数の比較.

	巣立ち			
	成功	失敗	不明	合計
壁沿いの巣	67 (79%)	10 (12%)	8 (9%)	85
壁沿いでない巣	14 (54%)	8 (31%)	4 (15%)	26
合計	81	18	12	111

表 2. 赤岩対岸のウミガラスのコロニーにおける 2012~2019 年までの 8 年間の各営巣場所の繁殖成績. ○ は巣立ちに成功した巣, × は営巣したが巣立ちに失敗した巣, U は営巣したが巣立ちの成否がわからなかった巣, UC は営巣していたかどうか不明な巣, - は営巣しなかった巣を示す

注) ウミガラスの個体識別は行っていないため, 表の最上列はつがい番号ではなく営巣場所の番号を示している.

年 Year / 巣番号 Nest no.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	C1	C2	C3	C4	C5	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	O1	O2	O3	O4	O5
2012	○	○	○	-	-	UC	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	×	○	○	○	×	×	-	-	-	-	-	UC	UC	-	-	-
2013	○	○	×	-	-	-	-	-	-	-	×	○	-	-	-	○	○	○	○	×	○	○	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	×	×	-	-	○	○	○	○	○	○	×	×	○	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	○	○	○	×	-	UC	-	-	-	-	○	○	×	-	-	○	○	○	○	○	×	-	-	×	U	-	-	UC	UC	-	-	-
2016	○	○	○	U	○	UC	-	-	-	-	○	○	-	×	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	U	-	-	UC	UC	-	-	-
2017	○	○	○	○	×	○	○	×	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	×	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-
2018	○	○	×	○	×	○	○	○	-	-	○	○	×	×	○	○	○	U	U	U	U	-	-	U	○	U	×	○	○	○	○	-
2019	○	×	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	UC	UC	-	×	○	UC	○	○	○	○	○	○
壁沿いの巣 Nest along the w	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No	Yes	Yes	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
8年間利用率 Occupancy for	100	100	100	63	50	25	38	25	13	13	100	100	50	50	38	100	100	100	100	100	75	38	25	75	50	13	25	38	38	25	25	13

2019 年に新たに確認された営巣場所

繁殖成功率と産卵・抱卵・孵化・巣立ちの状況

・繁殖成功率

2019年は赤岩対岸の繁殖コロニーで26つがいの繁殖を確認した(表2)。孵化率は92.3%(26個の卵のうち24個の卵が孵化)だった。孵化したヒナの巣立ち成功率は95.8%(24羽中23羽のヒナ)だった。繁殖に失敗したL2においては5/23に卵が確認されたが6/24に卵が消失した。その後7/8に再び卵を確認することができたため6/25から7/8の間の期間に追卵したと思われる。(付表2)。

・産卵および抱卵

産卵日は、卵・雛が確認された26巣のうち、最初に卵が確認された日、もしくは、転卵行動がみられた日の前日に、各巣に卵がなかったことを確認して特定した(付表2)。

コロニー内で最も早く産卵が確認された営巣場所はL3で、産卵日は2019年5月21日であり、L3の場所では昨年も最も早く産卵が確認された。2019年の産卵開始日は、2018年より2日早かったが、例年とほとんど差はなかった。

・孵化

繁殖が確認された26巣のうち、24巣で孵化したことが確認された。孵化日は、前日に卵だったのが翌日にヒナになっていること、もしくは、その日のうちに卵からヒナになっていることを映像により確認することで特定した。孵化日は早い個体で6月23日であった(付表2)。また、今年は落石によるケーブル断線で、6月25日から7月7日の期間は映像を録画できなかったため、ほとんどの個体は孵化日を特定することはできなかった。

・巣立ち

2019年7月16日から8月3日にかけて、23巣のヒナの巣立ちを確認した(表2, 付表2)。各巣における巣立ち日時は、すべてCCDカメラの映像に基づいて判定した。繁殖巣棚の開口部の方に親と子が一緒に歩いて出ていく姿が最後に確認された日付および時刻を巣立ち日時とした。最も早い巣立ち日を年ごとに比較すると、2014年7月12日、2015年7月15日、2016年7月4日、2017年7月10日となり、2018年7月16日2019年の巣立ち開始日は例年と同じような時期であった。


そして、8月5日におそらく最後まで残っていたと思われるヒナ1個体がハシブトガラスに捕食されたことが確認された。この時巣棚内に親鳥は確認されなかったためヒナは親が不在で取り残されている状態だったと考えられる。次の日の8月6日にカラスが飛来し前日に捕食し放置されていたヒナを再び採餌していた。その後オオセグロカモメが飛来し放置されていた死体を啜って飛び去った。

繁殖ステージの進行とコロニー内の個体数変化

2019年4月24日に赤岩対岸の繁殖地内に設置した CCD カメラの映像に基づいて、繁殖地に滞在する成鳥の個体数を記録した（付表 1）。産卵が始まる前の 5 月 14 日に 2019 年の最大個体数となる成鳥 57 個体が録画映像で確認された（図 6, 付表 1）。ウミガラスは 2018 年と同様に、繁殖コロニー内で最初の産卵が確認されるまでは、日中に繁殖地からすべての個体がいなくなる日があった（図 6, 付表 1）。また 1 日のなかで最小個体数と最大個体数が共に 0 だった日は、撮影した時間帯の全ての正時に繁殖地に全く成鳥がいなかったことを示す。

2019 年に最初に産卵が確認されたのは 5 月 21 日で、それ以降は繁殖地には常に成鳥が滞在するようになった（図 6, 付表 1）。ヒナが巣立ちはじめの時期になると、繁殖地に滞在する成鳥の個体数は徐々に減少していった（図 6）。そして、最後まで繁殖巣棚に残っていたと思われるヒナが 8 月 5 日の 14 時 37 分にハシブトガラスに捕食され（付図 2）。2019 年の繁殖は全て終了した（付表 2）。

(a)



(b)




図6. 赤岩対崖の繁殖巣棚における (a) 2018年4月24日~7月31日までと (b) 2019年4月25日~8月3日の成鳥の個体数の変化. 青線はその日にカウントされた最大個体数, 赤線はその日にカウントされた最小個体数を示す. 両年ともに産卵が開始すると繁殖コロニー内に成鳥が常時滞在するようになる. 2017年のデータは比較のために, 環境省北海道地方環境事務所(2017)より再掲.

(4) デコイ再設置の概要

デコイは2018年8月に以下の通りに設置した(図7)。

また2019年4月にカメラ機材設置作業に合わせて新たに6体設置した(図8)。

- A** : 巣棚に向かって右奥は壁際であり本来は繁殖に適した場所であると思われるが、左側と比べデコイが少なく空間が広めであり、利用率や繁殖成績から安心して繁殖できる環境でない可能性があるためデコイを新たに設置した。
- B** : 2017年に繁殖が確認され、今後も繁殖すると思われる箇所であるが、巣棚の手前にデコイが少ないためカラスが侵入しやすいと考えられる。そのため巣棚開口部付近にカラスの侵入防止のためデコイを新たに設置した。
- C** : VDSボックス周辺はハシブトガラスの主な侵入ルートになっている。そのため外側からの開口部をなくし、カラス等の侵入を防ぐためにデコイを設置した。また、繁殖巣棚向かって左奥にある石の右側に設置してある3つのデコイ(座位)は撤去し、カラスが左側の岩に侵入しにくいように立ちデコイに交換した。また、カラスの止まり台になるVDS上にデコイを設置するのは難しいため設置しなかった。
- D** : 巣棚の開口部付近は作業に支障が出るためデコイは設置しなかった。






図7. デコイ再設置後の繁殖巣棚内のイメージ図

(a)



(b)



(c)




図 8. 2019 年 4 月に設置したデコイ設置後の繁殖巣棚内の概要。(a) 繁殖巣棚に向かって右側 (b) 繁殖巣棚に向かって中央 (c) 繁殖巣棚に向かって左側

ウミガラスは多くて1㎡で20つがいに達することもあるということが報告されていることから、実際に赤岩対崖の巣棚では最大何つがい繁殖することが可能かを推定した。

巣棚の開口部は傾斜になっており、また外敵にも襲われやすいため営巣には適した環境ではないが、それらの要因を除き、面積だけを考慮し推定を行った。繁殖可能だと思われる範囲の面積は推定36300～40500 cm² (図9) であるため、1㎡あたり20つがいの密度で営巣したら72～81つがい営巣可能だと考えられる。72～81つがい営巣すると仮定した場合、今年度は26つがい営巣していたため、あと46～55つがい営巣可能だと考えられる。また、昨年度あたりから新しい営巣場所が増え、徐々に営巣場所が広がりつつあるので、今後も状況に応じてデコイの配置を見直していくことが重要だと考えられる。




図9. 繁殖巣棚内の概要




図10. 営巣範囲の概要

1-3. 捕食者対策

(1) 目的

天売島のウミガラスは、2009年以降、赤岩対崖の繁殖地のみで繁殖しており、繁殖つがい数が極めて少なくなった近年では、オオセグロカモメやハシブトガラスによる卵や雛の捕食が繁殖失敗の主要因となっていた。このため2011年からは捕食者対策を強化し、赤岩対崖繁殖地で営巣するウミガラスの卵や雛の捕食者となるオオセグロカモメやハシブトガラスを空気銃による捕獲を開始した(表4)。空気銃による捕食者の対策を行う以前は、ウミガラスの雛や卵がオオセグロカモメやハシブトガラスによって捕食され、2010年には赤岩対崖繁殖地でウミガラスが途中で繁殖をやめてしまったこともあった。しかし捕食者対策を強化した2011年以降は、オオセグロカモメの繁殖地への飛来は記録されなくなり、ハシブトガラスの飛来は記録されているが、2011-2019年にかけて7-23羽のウミガラスのヒナが9年連続で巣立ちに成功している(図5)。捕食者対策前後の赤岩対崖の繁殖地の巣立ち成功率を比較すると、対策前(2008-2010年)に33%(12ペア中4ペア)だった巣立ち成功率が、対策後(2011-2019年)は78%(150ペア中118ペア)まで向上した(表2)。

2019年はこれまでと同様に、(1)赤岩対崖繁殖地で繁殖するウミガラスの捕食者対策として、繁殖地周辺に定住しているオオセグロカモメと、海鳥繁殖地周辺および島中央部の森林部に生息するハシブトガラスを空気銃で捕獲した。また、(2)潜在的な捕食者となるハシブトガラスの生息数を把握するために、天売島全域でルートセンサスを実施した。


さらに、(3)CCDカメラの映像から赤岩対崖のウミガラス繁殖地へのハシブトガラスとオオセグロカモメが侵入した頻度を調べた。

また今年度も、上記の取り組みに加え、ハシブトガラスの営巣地を把握し試行的に巣落とし作業を一般財団法人天売島おらが島活性化会議に委託し実施した。


(2) 方法

ハシブトガラスとオオセグロカモメの捕獲

ウミガラスの繁殖期の5月から7月にかけて海鳥繁殖地周辺で、音の小さな空気銃を使用して、ウミガラスの卵および雛の捕食者となるハシブトガラスとオオセグロカモメの捕獲を8回行った。ハシブトガラスは海鳥繁殖地周辺および島中央部の森林部（[図 11](#)），オオセグロカモメは赤岩対崖繁殖地周辺に限定して（[図 12](#)），捕獲を実施した。



[図 11](#). ハシブトガラスを空気銃によって捕獲した場所。



[図 12](#). オオセグロカモメを空気銃によって捕獲した場所。

カラス類の個体数調査

ウミガラスの繁殖期に卵やヒナの潜在的な捕食者となるハシブトガラスの生息状況を調べるため、天売島全域でカラス類の個体数調査を2019年5月27日から7月22日にかけて合計3回実施した。

この個体数調査は、車上からの目視によるルートセンサスで実施した。車でルートをできるだけ一定の速度（5-10km/h程度）で移動して、両側100m以内に現れたカラス類（ハシブトガラス、ハシボソガラス、ミヤマガラス）の各種の個体数を数えた。ルートセンサスのコースの環境は、集落（黒色の実線）・海鳥繁殖地周辺（点線）・港周辺（灰色部分）・森林部（灰色の実線）に分けた（[図 13](#)）。




図 13. 天売島におけるカラス類のルートセンサスのコース。

ハシブトガラスの試行的巣落とし

天売島の海鳥繁殖地を中心に国指定天売島鳥獣保護区全域を対象に、ハシブトガラスの営巣地の確認作業を8日間実施し、巣落とし作業を4日間実施した。確認作業は車両や徒歩で行った。巣落とし作業は竹棒などを用いて実施した。

赤岩対崖のウミガラス繁殖地への捕食者の侵入

2019年4月25日から8月10日まで、赤岩対崖繁殖巣棚に設置した4台のCCDカメラで撮影した映像をみて、ハシブトガラスとオオセグロカモメの侵入や卵・雛の捕食行動の有無を確認した。捕食者が赤岩対崖繁殖地に接近もしくは侵入した場合には、捕食者とウミガラスの行動を記録した。

(3) 結果と考察

ハシブトガラスとオオセグロカモメの捕獲

2019年はハシブトガラス合計74個体、オオセグロカモメ合計22個体を空気銃で捕獲した(表4)。ハシブトガラスは海岸線では捕獲できず、陸地で74個体を捕獲した。海鳥繁殖地の海岸線ではハシブトガラスを確認したが、崖の上部や上空を飛行することが多く、海岸線に降り立つことが少なかったため捕獲が困難であった。オオセグロカモメは赤岩対崖繁殖地周辺において22個体を捕獲した。

表 4. 天売島におけるハシブトガラスとオオセグロカモメの空気銃による捕獲数. 海岸は赤岩対崖繁殖地周辺の海岸線. 陸には海鳥繁殖地の草地と島中央部の森林部が含まれる.

年	ハシブトガラス	オオセグロカモメ
2011	42	100
2012	40	41
2013	38	28
2014	61	17
2015	51	16
2016	51	27
2017	68	24
2018	44	25
2019	74	22

2019年の内訳

日付	ハシブトガラス			オオセグロカモメ	備考
	海岸	陸	合計		
5/13	0	4	4	1	
6/7	0	14	14	7	
6/24	0	10	10	3	
7/1	—	13	13	4	陸のみ
7/8	0	2	2	1	
7/12	0	5	5	4	
7/15	0	17	17	2	
7/22	—	9	9	0	陸のみ




図 14. オオセグロカモメの捕獲数と経年変化

カラス類の個体数調査

2019年5月27日から7月22日の期間に計3回個体数調査を実施した結果、ハシブトガラスの個体数は平均80個体（最小-最大：31-126個体）であった（表5）。ハシボソガラスの個体数はハシブトガラスより少なかった。また、ミヤマガラスは確認されなかった。

ハシブトガラスの生息密度は時期により変化し、海鳥の本格的な繁殖シーズンである6月および巣立ちの時期である7月は海鳥繁殖地周辺で活動する個体数が最も多かった。また、7月下旬はカラスがねぐらとしている森林部や集落においても多く確認された。特に森林部においてはカラスの巣立ち雛が多く確認された。

表5. ルートセンサスによる天売島のカラス類の個体数調査の結果

ハシブトガラス

	海鳥繁殖地周辺	森林部	集落	港周辺	合計
2019/5/27	19	2	9	1	31
2019/6/3	77	2	6	0	85
2019/7/22	78	32	16	0	126

ハシボソガラス

	海鳥繁殖地周辺	森林部	集落	港周辺	合計
2019/5/27	0	0	2	1	3
2019/6/3	0	0	1	2	3
2019/7/22	0	1	0	0	1

表6. 天売島におけるハシブトガラスの個体数と捕獲数の年比較.

年	最大個体数（日付）	年間捕獲数
1988	136 (10/16)	—
2010	134 (9/11)	—
2011	88 (8/31)	42
2012	64 (5/19)	40
2013	166 (10/23)	38
2014	135 (11/1)	61
2015	77 (10/21)	51
2016	86 (6/6)	51
2017	159 (10/26)	68
2018	115(11/7)	44
2019	126(7/22)	74




図 15. ハシブトガラスの最大個体数と捕獲数の経年変化

ハシブトガラスの試行的巣落とし

確認調査では、5月1日から20日の期間中8日間において海鳥繁殖地の他、住宅地と森林部の中間付近などでハシブトガラスと思われる巣を15巣確認した。5月7日から21日の期間中4日間において15巣(9羽のヒナ、3個の卵)の巣落としを行い、ヒナは適切に処分した。なお確認した巣のうち海鳥繁殖地でのカラスの巣は、作業を行えないような崖付近で確認されたという理由などで巣落としは出来なかった(表7、図16)。

表 7. 確認調査の概要

日付	巣番号	箇所	ヒナ、卵の数	備考
5/7	①	天売港付近の急傾斜地		
5/7	②	天売港付近の急傾斜地		
5/7	③	天売港付近の急傾斜地	卵：1個	
5/7	④	天売港付近の急傾斜地		
5/8	⑤	天売港付近の急傾斜地		
5/8	⑥	天売灯台付近		
5/8	⑦	フットパス	卵：1個	
5/8	⑧	富磯町住付近	ヒナ：5羽	
5/16	⑨	天売港付近の急傾斜地		
5/16	⑩	天売港付近の急傾斜地		
5/16	⑪	天売港付近の急傾斜地	卵：1個	
5/16	⑫	天売港付近の急傾斜地		
5/21	⑬	巖島神社付近 のトドマツ		
5/21	⑭	巖島神社付近 のトドマツ	ヒナ：4羽	
5/21	⑮	海竜寺付近		




図 16. ハシトガラスの営巣場所調査で確認することのできた営巣地点

ウミガラス繁殖地への捕食者の侵入頻度と影響

空気銃による捕食者の駆除を行う前は、2009年にオオセグロカモメがウミガラスのヒナを捕食し、2010年にはオオセグロカモメが赤岩対崖のウミガラス繁殖地に飛来した後、ウミガラスが途中で繁殖をやめてしまうことがあった。しかし、空気銃による駆除を開始した2011年以降は途中で繁殖をやめてしまうという事は確認されていない。また2011年から2018年はオオセグロカモメの巣棚への侵入も確認されていなかったが、2019年は7回飛来が確認された。これはオオセグロカモメの繁殖開始時期が例年よりも遅く、例年であればウミネコやウトウのヒナを捕食していた個体が、例年通り餌を取ることができずに、7月末まで育雛しているウミガラスのヒナを狙いに来たという可能性も考えられる(表9)。

ハシトガラスは2019年4月23日から8月10日までCCDカメラの映像の中で、赤岩対崖の繁殖地に合計19回侵入していた(表8, 9)。

ハシトガラスが飛来した際、ウミガラスが繁殖巣棚内にいる時は、全ての成鳥が一斉に首を伸ばしてハシトガラスの方に嘴を向けて威嚇する行動がみられ、ハシトガラスはコロニーの内部には侵入できずに立ち去るケースが多かった。しかし、産卵期前に、ハシトガラスが巣棚の入り口でしつこく侵入を試みたために巣棚にいたウミガラスが全羽飛び去るということが2回確認された。

7月31日以降は、ウミガラスが繁殖を終了しており、ウミガラスは繁殖巣棚に時折姿を見せる程度でほとんどいない状況であった。全ての成鳥が不在の時には、ハシトガラスは繁殖巣棚の奥の方まで入り歩き回って探査し、孵化せずに放置されていた卵をつつく様子や最後まで巣棚に残っていたヒナが捕食される様子が確認された。また、2018年で確認することのできたハシトガラスの繁殖巣棚内への侵入回数と経路を見てみると、19回侵入しており、石やデコイ、VDSボックスの上に立ち中を伺っている様子が確認された(図18)。中の様子を伺うときにはVDSボックスや巣棚の右側のデコイの上に止まっていたことが確認された。2019年度は落石によるケーブル断線によりカラスの侵入状況を全て把握することはできなかったが、確認できた19回のうち15回の侵入経路を確認したところ、2018年の侵入経

路と同じような場所や経路を利用している傾向にあった (図 19).

表 8. 捕食者の赤岩対崖繁殖地への飛来状況とウミガラスへの影響.

年	捕獲 (空気銃)	捕食者		備考
		オオセグロカモメ	カラス	
2009	無	雛 1 羽捕食を目撃		
2010	無	8 回飛来 (1 回卵殻くわえる)	15 回飛来 ・ 卵 1 を持ち去る	7/11 繁殖個体いなくなる
2011	有	0 回飛来 (近場の飛来あり)	7 回飛来 ・ 1 回成鳥を飛去させる	
2012	有	0 回飛来 (近場の飛来あり)	1 回飛来	
2013	有	0 回飛来	2 回飛来	
2014	有	0 回飛来	16 回飛来	
2015	有	0 回飛来	11 回飛来	
2016	有	0 回飛来	5 回飛来 ・ 雛 1 羽を持ち去る	
2017	有	0 回飛来	16 回飛来 ・ 雛 1 羽を持ち去る	
2018	有	0 回飛来	19 回飛来 ・ 雛 1 羽を持ち去る ・ 1 回成鳥を飛去させる	
2019	有	7 回飛来	10 回飛来 ・ 雛 1 羽を捕食 ・ 2 回成鳥を飛去させる	

表9. 2019年4月24日から8月10日までの期間に撮影したCCDカメラの映像で確認したカラスの赤岩対崖繁殖地への飛来・侵入状況.

侵入回数	日付	侵入時刻 警戒開始	退出時刻 警戒終了	滞在時間 警戒時間	カメラ	侵入場所	カラスの行動	ウミガサスの行動	繁殖ステージ	備考
①	2019/5/9	8:48:45	8:49:54	0:01:09	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。左側でしばらく様子を伺い、中央の方に移動し、ウミガサスが巣棚内に落ちた魚をくわえて巣棚内の様子を伺った後飛び去る。	3羽のみ巣棚にいる。カラスが少し動いたため、3羽とも飛び立つ。	産卵前	ハシトガラス(嘴が血で染まっていた)
②	2019/5/9	8:50:48	8:50:58	0:00:10	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって右側から侵入。左側でしばらく様子を伺い、中央の方に移動し、ウミガサスが巣棚内に落ちた魚をくわえて巣棚内の様子を伺った後飛び去る。	3羽のみ巣棚にいる。カラスが少し動いたため、3羽とも飛び立つ。	産卵前	ハシトガラス(嘴が血で染まっていた。上と同じ個体)
③	2019/5/16	9:50:33	9:51:13	0:00:40	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。左側でしばらく様子を伺い、飛び去る。	2羽のみ巣棚にいる。カラスが少し動いたため、少し離れる。	産卵前	ハシトガラス
4	2019/5/24	4:07:27	4:08:36	0:01:09	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。左側でしばらく休息し、飛び去る。	首を伸ばして少し警戒	産卵期	ウミウ
⑤	2019/6/7	18:27:52	18:28:33	0:00:41	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から中央に向かい侵入。左側でしばらく様子を伺い、飛び去る。	首を伸ばして少し警戒	産卵期	ハシトガラス
6	2019/6/8	17:18:06	17:19:10	0:01:04	WR	中央	巣棚中央に飛来し、巣棚を横切り左奥へ移動。	首を伸ばして警戒	産卵期	ウミウ
⑦	2019/6/9	18:35:24	18:36:43	0:01:19	WR	中央	巣棚中央から飛来し、巣棚内の様子を伺いながら左奥へ移動。	首を伸ばし、前後に動かしながら威嚇	産卵期	ハシトガラス
⑧	2019/6/11	7:46:49	7:50:50	0:04:01	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。しばらく左側で佇立していたが中央に移動。コネクタの収納ボックス付近まで近づき、R12を攻撃。その後R9に近づき攻撃。再びR12のところへ行き攻撃。しばらく滞在したのち飛び去る。	首を伸ばして前後に動かし鳴いて威嚇	産卵期	ハシトガラス
⑨	2019/6/11	12:23:43	12:24:52	0:01:09	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。巣棚の中央まで移動し様子を伺う。しばらくして飛び去る。	首を伸ばし、前後に動かしながらウーウーと鳴いて威嚇	産卵期	ハシトガラス
⑩	2019/6/12	9:23:29	9:24:28	0:00:59	WR	中央	巣棚に向かって中央から侵入。巣棚の中の様子を伺いながら左側へ移動。	首を伸ばし、ウーウーと鳴いて威嚇	産卵期	ハシトガラス
⑪	2019/6/12	17:19:38	17:23:56	0:04:18	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。少し離れたところから様子を伺い、O5をつついて攻撃。しばらくして去る。	首を伸ばして警戒。少しウルル〜と鳴いて威嚇	産卵期	ハシトガラス
12	2019/6/22	5:05:19	5:05:31	0:00:12	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。しばらく左側でウロウロして去る	首を伸ばして警戒。少しウルル〜と鳴いて威嚇	育雛期	オオセグロカモメ
13	2019/6/22	8:41:52	8:46:48	0:04:56	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。しばらく左側でウロウロして去る	首を伸ばして少し警戒	育雛期	オオセグロカモメ
14	2019/6/22	8:51:09	8:58:45	0:07:36	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。左側周辺をウロウロし、ウミウの巣をつつく(巣材集め?)。しばらくして飛び去る。	首を伸ばして少し警戒	育雛期	オオセグロカモメ
15	2019/6/22	10:39:14	10:40:43	0:01:29	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。左側周辺をウロウロし、ウミウの巣をつつく(巣材集め?)。しばらくして去る。	首を伸ばし、前後に動かしながらウーウーと鳴いて威嚇	育雛期	オオセグロカモメ
16	2019/6/22	10:51:10	10:52:51	0:01:41	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。左側周辺をウロウロしてしばらくして去る。	首を伸ばして警戒。少しウルル〜と鳴いて威嚇	育雛期	オオセグロカモメ
17	2019/6/23	7:03:20	8:48:46	1:45:26	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。しばらく様子を伺っていたが、右側に少しずつ移動し、巣棚の一番左側で産卵(非繁殖個体)している個体をつつく(7:06:06~7:07:00の1分間ほど)。その後しばらく近くで休息。その後去る	首を伸ばして少し警戒。つかれた個体はつき返して応戦	育雛期	ウミウ
⑮	2019/6/23	9:30:40	9:33:06	0:02:26	WR	右側	巣棚に向かって右側から侵入。L9の周辺をうろついて飛び去る	首を伸ばしてウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	ハシトガラス
19	2019/6/23	11:21:55	11:34:48	0:12:53	WR	右側	巣棚に向かって右側から侵入。R12の周辺でウロウロした後、左側の方に移動し飛び去る	首を伸ばしてウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	オオセグロカモメ
20	2019/6/23	12:05:02	12:09:35	0:04:33	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。左奥をウロウロした後、左側の方に移動し飛び去る	首を伸ばしてウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	オオセグロカモメ
21	2019/6/23	18:47:53	18:50:04	0:02:11	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。左奥をウロウロした後、ウミウの巣の方へ去る	巣棚入り口付近にいた5羽は飛去。首を伸ばしてウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	オオセグロカモメ
⑳	2019/7/8	5:21:39	5:23:27	0:01:48	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。左奥から右側に移動した後、中央まで移動し中の様子を伺う。その後ウロウロして右側から飛び去る	首を伸ばして警戒。少しウルル〜と鳴いて威嚇	育雛期	ハシトガラス
㉑	2019/7/11	8:02:13	8:03:09	0:00:56	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。左奥から右側の方へ移動し飛び去る	首を伸ばしてウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	ハシトガラス

※侵入回数の欄の○囲いの数字はハシトガラスの侵入

表9. 2019年4月24日から8月10日までの期間に撮影したCCDカメラの映像で確認したカラスの赤岩対崖繁殖地への飛来・侵入状況.

(つづき)

侵入回数	日付	侵入時刻 警戒開始	退出時刻 警戒終了	滞在時間 警戒時間	カメラ	侵入場所	カラスの行動	ウミガラスの行動	繁殖ステージ	備考
㉒	2019/7/12	9:09:29	9:09:34	0:00:05	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。左奥から右側の方へ移動し飛び去る	音を伸ばしてウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	ハシブトガラス
㉓	2019/7/12	9:57:41	9:58:43	0:01:02	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。左奥から中央へ移動し、中の様子を伺い少し巣棚入り口付近をウロウロし飛び去る	音を伸ばしてウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	ハシブトガラス
㉔	2019/7/15	6:41:39	6:42:37	0:00:58	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。左奥から右側へ移動し、中の様子を伺い少し巣棚入り口付近をウロウロし飛び去る	音を伸ばしてウーウー、オロロンと鳴きながら威嚇	育雛期	ハシブトガラス
27	2019/7/19	9:09:20	9:20:22	0:11:02	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。しばらく左側でウロウロして去る	音を伸ばしてウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	オオセグロカモメ
28	2019/7/19	11:07:53	11:08:10	0:00:17	WR	中央	巣棚に向かって中央周辺から侵入。少しして飛び去る	音を伸ばしてウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	オオセグロカモメ
29	2019/7/19	11:08:58	11:11:58	0:03:00	WR	中央	巣棚に向かって中央周辺から侵入。左の方に移動しO4に近づきウロウロ。少しして左側に飛び去る	音を伸ばしてウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	オオセグロカモメ
30	2019/7/19	11:24:09	11:24:58	0:00:49	WR	中央	巣棚に向かって中央周辺から侵入。少しの間奥の様子を伺いR12を攻撃しようとしてその後飛び去る	音を伸ばして前後に動かしウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	オオセグロカモメ
31	2019/7/19	11:26:36	11:27:15	0:00:39	WR	中央	巣棚に向かって中央周辺から侵入。しばらく中の様子を伺い飛び去る	音を伸ばして前後に動かしウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	オオセグロカモメ
32	2019/7/19	11:44:45	11:51:58	0:07:13	WR	中央	巣棚に向かって中央周辺から侵入。L9の周辺をうろついて飛び去る	音を伸ばして前後に動かしウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	オオセグロカモメ
33	2019/7/19	12:44:40	12:51:58	0:07:18	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。O5の周辺をうろついて左側に移動	音を伸ばして警戒	育雛期	オオセグロカモメ
34	2019/7/19	18:54:41	18:58:05	0:03:24	WR	中央	巣棚に向かって中央周辺から侵入。R12周辺で様子を伺い左側の方へ移動	音を伸ばしてウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	オオセグロカモメ
35	2019/7/20	6:11:28	6:14:46	0:03:18	WR	中央	巣棚に向かって中央周辺から侵入。右側をウロウロしその後左側へ移動し飛び去る	音を伸ばして前後に動かしウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	オオセグロカモメ
㉕	2019/7/24	17:09:30	17:10:32	0:01:02	WR	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。周辺をウロウロしながら中の様子を伺う。少しして飛び去る。	音を伸ばして前後に動かしウーウーと鳴きながら威嚇	育雛期	ハシブトガラス
㉖	2019/8/5	14:26:00	14:38:00	0:12:00	インターバルカメラ	中央	中央から入り、巣棚の入り口周辺をウロウロ。巣棚の奥に入りヒナ(恐らく最後まで残っていたヒナ)を巣棚入り口で捕食。その後飛び去る。	全員不在 ヒナ1羽のみ巣棚内に残っている	巣立ち後	ハシブトガラス
㉗	2019/8/6	15:22:51	15:23:58	0:01:07	WL	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。巣棚の中をウロウロ見て探査し去る。	全員不在	巣立ち後	ハシブトガラス
㉘	2019/8/8	10:39:26	11:17:48	0:38:22	WL	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。巣棚の中をウロウロ見て探査。 10:57:33 - 10:58:23 未孵化卵をつついて食べる 10:58:32 もう一羽ハシブトガラスが侵入 10:58:43 餌渡し 後から来たハシブトガラスが最初からいたハシブトガラスに餌をもらう 10:58:44 更にもう一羽カラスが侵入	全員不在	巣立ち後	ハシブトガラス
㉙	2019/8/8	11:32:21	11:35:35	0:03:14	WL	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。巣棚の中をウロウロ探査	全員不在	巣立ち後	ハシブトガラス
㊱	2019/8/8	11:40:05	11:45:27	0:05:22	R	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。巣棚の中をウロウロ探査	全員不在	巣立ち後	ハシブトガラス 2羽
㊲	2019/8/8	14:40:12	14:43:09	0:02:57	WL	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。巣棚の中をウロウロ探査 14:41:46 卵をついばむ	全員不在	巣立ち後	ハシブトガラス
㊳	2019/8/8	15:35:54	15:45:07	0:09:13	WL	左側(北西側)	巣棚に向かって左側から侵入。巣棚の中をウロウロ探査 14:41:46 卵をついばむ	全員不在	巣立ち後	ハシブトガラス 3羽
㊴	2019/8/10	13:25:06	13:32:48	0:07:42	WL	中央	巣棚に向かって中央から侵入。巣棚の中をウロウロ探査 未受精卵の残りをついばみ少しして飛び去る	全員不在	巣立ち後	ハシブトガラス 13:29:00頃 2羽目のハシブトガラスが侵入
㊵	2019/8/10	13:39:09	13:44:09	0:05:00	WL	中央	巣棚に向かって中央から侵入。巣棚の中をウロウロ探査	全員不在	巣立ち後	ハシブトガラス 2羽

※侵入回数の欄の○囲いの数字はハシブトガラスの侵入




図 17. 各繁殖ステージにおける 2014~2018 年と 2019 年のカラスの平均侵入頻度

2018年のカラスの侵入経路（侵入回数：合計19回）

よく通った (3回以上) 1~2回通った 経路がよくわからない




図 18. 2018 年におけるカラスの侵入回数および経路

2. 普及啓発

(1) 情報配信

ウミガラスの繁殖状況について報道機関に情報を配信した。インターネットでは北海道海鳥センターのHP (<http://www.seabird-center.jp/>) や SNS などを通してウミガラスの繁殖情報を配信した (図 20)。


(2) 展示

A4 サイズにカラー印刷してラミネート加工したウミガラスの繁殖情報を、天売島海鳥観察舎・羽幌および天売島のフェリー乗り場・北海道海鳥センターなどに掲示した (図 20)。

(3) 講演

天売島で 2019 年 10 月 19 日に開催された『オロロン鳥天売報告会』や 2019 年 9 月中旬に帝京科学大学で開催された『2019 年度日本鳥学会』において 2019 年のウミガラス保護増殖事業について発表した (図 19)。


北海道海鳥センターの Facebook とブログでウミガラスの繁殖状況の映像を公開。



ウミガラスの繁殖状況を周知する掲示板



『2019 年度鳥学会』(2019/9/中旬)



『天売おろろん報告会』(2019/10/19)



図 19. 普及啓発。



付図1. 赤岩対崖の繁殖巣棚 (2019年4月26日).

左上が WL カメラ, 右上が WR カメラ, 左下が L カメラ, 右下が R カメラの映像.

(a)



(b)



付図2. 繁殖巣棚に設置したインターバルカメラで撮影されたヒナの捕食シーン.

(a) 8/5 最後まで残っていたと思われるヒナをハシブトガラスが捕食する様子. (b) 8/6 前日カラスに捕食され放置されていた死体をオオセグロカモメが捕食し持ち去る。

日齢			
1 齢 (1-7 日)			
	1 日：卵歯あり	1 日：とても小さい	6 日
2 齢 (7-11 日)			
	8 日：胸に白い部分	11 日	
3 齢 (12-15 日)			
	12 日：白い顎	15 日：白が頬に広がる	
4 齢 (16 日-)			
	16 日：頬に黒帯が出現	18 日：	21 日：頬の黒帯が明瞭

付図 3. ヒナの日齢 (U.S. Fish and Wildlife Service 未発表データを改変)

4. 引用文献

- Boekelheide RJ, Ainley DG, Morrell SH, Huber HR & Lewis TJ (1990) Common Murre. Seabirds of Farallon Islands (Ainley, D. G. & R. J. Boekelheide, Eds.), 245–275. Stanford University Press.
- del Hoyo J, Elliott A & Sargatal J eds (1996) *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
- Hall, M. A., Alverson, D. L., & Metzals, K. I. (2000). By-catch: problems and solutions. *Marine Pollution Bulletin*, 41(1), 204–219.
- Hasebe M, Aotsuka M, Terasawa T, Fukuda Y, Niimura Y, Watanabe Y, Watanuki Y & Ogi H (2012) Status and conservation of the Common Murre *Uria aalge* breeding on Teuri Island, Hokkaido. *Ornithological Science* 11: 29–38.
- 長谷部真 (2015) 生態図鑑 ウミガラス. *Bird Research News* 12(7): 2–3.
- 北海道保健環境部自然保護課 (1989) 天売島ウミガラス生息実態調査報告書.
- 北海道保健環境部自然保護課 (1990) 天売島ウミガラス生息実態調査報告書.
- 北海道保健環境部自然保護課 (1991) 天売島ウミガラス生息実態調査報告書.
- 北海道海鳥センター (2002.) 環境省ウミガラス保護増殖事業 2001 年度調査等報告書.
- 北海道海鳥センター (2003) 環境省ウミガラス保護増殖事業 2002 年度調査等報告書.
- 北海道海鳥センター (2004) 環境省ウミガラス保護増殖事業 2003 年度調査等報告書.
- 環境省北海道地方環境事務所 (2006) 平成 17 年度ウミガラス保護増殖事業調査業務報告書.
- 環境省北海道地方環境事務所 (2010) 平成 21 年度ウミガラス保護増殖事業報告書.
- 環境省北海道地方環境事務所 (2011) 平成 22 年度ウミガラス保護増殖事業報告書.
- 環境省北海道地方環境事務所 (2012) 平成 23 年度ウミガラス保護増殖事業報告書.
- 環境省北海道地方環境事務所 (2013) 平成 24 年度ウミガラス保護増殖事業報告書.
- 環境省北海道地方環境事務所 (2014) 平成 25 年度ウミガラス保護増殖事業報告書.
- 環境省北海道地方環境事務所 (2015) 平成 26 年度ウミガラス保護増殖事業報告書.
- 環境省北海道地方環境事務所 (2016) 平成 27 年度ウミガラス保護増殖事業報告書.
- 環境省北海道地方環境事務所 (2017) 平成 28 年度ウミガラス保護増殖事業報告書.
- 環境省北海道地方環境事務所 (2018) 平成 29 年度ウミガラス保護増殖事業報告書.
- 環境省北海道地方環境事務所 (2019) 平成 30 年度ウミガラス保護増殖事業報告書.
- 環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室 (編) (2014) レッドデータブック 2014—日本の絶滅のおそれのある生物— 2 鳥類. 株式会社ぎょうせい, 東京.
- 環境庁, 1973. 特定鳥類等調査.
- 環境庁, 1978. 特定鳥類等調査.
- 黒田長久, 1963. 天売島海鳥調査 (附陸鳥). *山階鳥類研究所研究報告* 3: 16–81.
- Løkkeborg, S. (2011). Best practices to mitigate seabird bycatch in longline, trawl and gillnet fisheries—efficiency and practical applicability. *Marine Ecology Progress Series*, 435, 285–303.
- Melvin, E. F., Parrish, J. K. and Conquest, L. L. (1999) Novel tools to reduce seabird bycatch in coastal gillnet fisheries. *Conservation Biology* 13 (6), 1–12.
- Murphy EC & Schauer JH 1994. Numbers, breeding chronology, and breeding success of Common Murres at Bluff, Alaska, in 1975–1991. *Canadian Journal of Zoology* 72: 2105–2118.
- 武田由紀夫・寺沢孝毅・福田佳弘, 1992. ウミガラス生息実態調査. 北海道保健環境部自然保護課 (編), 天売島ウミガラス生息実態調査報告書: 1–48.
- 日本鳥学会 (2012) 日本鳥類目録改訂第 7 版. 日本鳥学会, 三田.
- 寺沢孝毅, 1990. 天売島におけるウミガラス生息実態調査. 北海道保健環境部自然保護課 (編), 天売島ウミガラス生息実態調査報告書: 2–20.
- 寺沢孝毅, 1991. 天売島におけるウミガラス生息実態調査. 北海道保健環境部自然保護課 (編), 天売島ウミガラス生息実態調査報告書: 2–17.
- 寺沢孝毅, 1992. ウミガラス誘致効果調査. 北海道保健環境部自然保護課 (編), 天売島ウミガラス生息実態調査報告書: 49–56.
- 寺沢孝毅, 1998. 1998 年の天売島におけるウミガラスの生息状況. 環境庁・羽幌町(編), 北海道天売島における海鳥群集基礎調査報告書.
- 寺沢孝毅・青塚松寿, 1986. 天売島における海鳥の繁殖状況. 留萌支庁委託調査報告書.
- 寺沢孝毅・福田佳弘・斉藤暢, 1995. 天売島におけるウミガラス生息状況. 北海道環境科学研究センター (編), ウミガラス等海鳥群集生息実態調査報告書 1992–1994: 3–15.
- Wang, J., Barkan, J., Fisler, S., Godinez-Reyes, C., & Swimmer, Y. (2013). Developing ultraviolet illumination of gillnets as a method to reduce sea turtle bycatch. *Biology Letters*, 9(5), 20130383.
- 綿貫豊・青塚松寿・寺沢孝毅, 1986. 天売島における海鳥の繁殖状況. *Tori* 34: 146–150.

綿貫豊・寺沢孝毅・青塚松寿・阿部永, 1988. 天売島のウミガラス生息実態調査. 北海道生活環境部
自然保護課 (編), 天売島ウミガラス生息実態調査報告書: 29-52.